



Laboratoire public
Conseil, Expertise et Analyse en Bretagne

Document d'accompagnement des prélèvements (DAP) demande d'analyses de Typage Virus Grippe porcine

Nom du vétérinaire : N° d'ordre :

Date des prélèvements :/...../.....

N° Département : Commune du site de prélèvement :

NOM et adresse de l'éleveur :
.....

Motif d'intervention :

Visite de routine ☐ Appel pour un syndrome grippal ☐ Autre :

Site d'élevage du prélèvement

Type d'élevage: N ☐ NE ☐ PS ☐ NPS ☐ PSE ☐ E ☐

Nbre places Truies : Nbre places PS : Nbre places Engraissement :

Un programme de vaccination anti-grippe est-il appliqué ? Oui (< 6 mois) ☐ Oui (> 6 mois) ☐ Non ☐

Nom commercial du vaccin :

Groupes d'animaux vaccinés : Cochettes ☐ Reproducteurs ☐ Issus ☐ (âge : semaine(s))

Fréquence de la vaccination : A l'arrivée en quarantaine ☐ Irrégulièrement ☐

(plusieurs réponses possibles) Bande à bande ☐ Tout le troupeau : tous les 6 mois ☐ ou tous les ans ☐

Animaux prélevés

Cochettes en quarantaine ☐ Truies mater. ☐ Truies gest. ☐ Porcs en croissance ☐ (âge : semaine(s))

Températures rectales des porcs prélevés (en °C) :

Syndrome grippal

Début du syndrome grippal : < 72h ☐ entre 72h – 1 semaine ☐ 1 semaine ☐

Type de grippe : Classique¹ ☐ ou Récurrente² ☐

Intensité des symptômes : Normale³ ☐ ou Elevée⁴ ☐

Suspicion vis-à-vis d'autres pathogènes : NON ☐ OUI ☐ Si oui lesquels :

Commentaires particuliers

.....
.....
.....

¹:Forme épisodique à l'échelle de l'élevage, pouvant se propager sur différentes classes d'âge au moment de l'épisode, sans caractère de récurrence à âge fixe.

²:Forme persistante à l'échelle de l'élevage, se répétant sur chaque bande ou presque dans une gamme d'âge déterminée.

³ : Manifestations cliniques modérées, associant de l'hyperthermie, des signes respiratoires frustes ou modérés (étternuements, toux, quelques dyspnées) et éventuellement une apathie associée à de l'anorexie ne dépassant pas 2-3 jours.

⁴ : Manifestations cliniques marquées, associant de l'hyperthermie, des signes respiratoires sévères (toux, toux quinteuses, dyspnée) sur une large proportion d'animaux et persistant plusieurs jours, éventuellement accompagnées de mortalité.