

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Vétérinaire

Nom :
N° d'ordre :
Adresse mail :

Éleveur

Nom :
Adresse :

Date des prélèvements : Commune du site de prélèvement : N° département :

Motif d'intervention

☐ Visite de routine ☐ Appel pour un syndrome grippal ☐ Autre :

Site d'élevage du prélèvement

Type d'élevage : ☐ N ☐ NE ☐ PS ☐ NPS ☐ PSE ☐ E

Nombre places truies : Nombre places PS : Nombre places engraissement :

Un programme de vaccination anti-grippe est-il appliqué ? ☐ Oui (< 6 mois) ☐ Oui (> 6 mois) ☐ Non

Nom commercial du vaccin :

Groupes d'animaux vaccinés : ☐ Cochettes ☐ Reproducteurs ☐ Issus Âge : semaines(s)

Fréquence de la vaccination : ☐ A l'arrivée en quarantaine ☐ Irrégulièrement ☐ Bande à bande
(plusieurs réponses possibles) ☐ Tout le troupeau : tous les 6 mois ☐ Tous les ans

Animaux prélevés

☐ Cochettes en quarantaine ☐ Truies mater. ☐ Truies gest. ☐ Porcs en croissance

Âge : semaines(s) Températures rectales des porcs prélevés (en °C) :

Syndrome grippal

Début du syndrome grippal : ☐ < 72 h ☐ Entre 72 h et 1 semaine ☐ 1 semaine

Type de grippe : ☐ Classique¹ ou ☐ Récurren²

Intensité des symptômes : ☐ Normale³ ou ☐ Élevée⁴

Suspicion vis-à-vis d'autres pathogènes : ☐ Non ☐ Oui ☐ Si oui lesquels :

Commentaires particuliers

Remarque : tous les résultats de génotypage SIV sont transférés au LNR-ANSES Ploufragan.

¹ : Forme épisodique à l'échelle de l'élevage, pouvant se propager sur différentes classes d'âge au moment de l'épisode, sans caractère de récurrence à âge fixe.

² : Forme persistante à l'échelle de l'élevage, se répétant sur chaque bande ou presque dans une gamme d'âge déterminée.

³ : Manifestations cliniques modérées, associant de l'hyperthermie, des signes respiratoires frustes ou modérés (éternuements, toux, quelques dyspnées) et éventuellement une apathie associée à de l'anorexie ne dépassant pas 2-3 jours.

⁴ : Manifestations cliniques marquées, associant de l'hyperthermie, des signes respiratoires sévères (toux, toux quinteuses, dyspnée) sur une large proportion d'animaux et persistant plusieurs jours, éventuellement accompagnées de mortalité.